

Pr KEYTRUDA[®]
(pembrolizumab)

Utilisez cette carte pour portefeuille
pour vous aider à vous rappeler certains
effets secondaires possibles associés à votre
traitement par PrKEYTRUDA[®] (pembrolizumab).

**Si vous présentez des symptômes, parlez-en à votre équipe
médicale sans tarder.**

Gardez cette carte pour portefeuille avec vous en tout temps

au cas où vous deviez aller à l'urgence ou consulter un
professionnel de la santé qui ne fait pas partie de votre
équipe soignante KEYTRUDA[®]. Cette carte fournira de
l'information importante permettant de comprendre votre
traitement et de prendre en charge les effets secondaires.

Mon nom : _____



Pour l'équipe soignante en cas d'urgence :

Je suis traité(e) par ^{Pr}KEYTRUDA® (pembrolizumab).
KEYTRUDA® n'est pas une chimiothérapie. Les effets
indésirables causés par KEYTRUDA® doivent être traités
de toute urgence et de façon appropriée.

Veillez communiquer immédiatement avec mon équipe d'oncologie.

Nom de mon oncologue : _____

N° de tél. au bureau : _____

N° de tél. après les heures de bureau : _____

Traité(e) pour : _____

Pourquoi KEYTRUDA® est-il utilisé?

KEYTRUDA®, aussi connu sous le nom de pembrolizumab, est un médicament d'ordonnance utilisé pour traiter :

- un type de cancer de la peau appelé « mélanome » chez les adultes
 - KEYTRUDA® peut être utilisé seul comme traitement initial lorsque votre mélanome :
 - s'est propagé ou ne peut être retiré par chirurgie (mélanome à un stade avancé).
- un type de cancer du poumon appelé « cancer du poumon non à petites cellules » chez les adultes
 - KEYTRUDA® peut être utilisé seul comme traitement initial lorsque le cancer du poumon :
 - s'est propagé (cancer du poumon à un stade avancé), ou
 - ne s'est pas propagé à l'extérieur de votre poitrine (stade III) et vous ne pouvez pas subir une intervention chirurgicale ou une chimiothérapie avec radiation, et
 - est associé à une réponse positive au test « PD-L1 », et
 - n'est pas associé à un gène anormal *EGFR* ou *ALK*.

On ne sait pas si KEYTRUDA® est sûr et efficace chez les enfants de moins de 18 ans.

KEYTRUDA® est administré lorsque le cancer s'est propagé ou ne peut pas être retiré par chirurgie.

Effets secondaires graves et mesures à prendre

Soyez à l'affût des effets secondaires possibles

Gardez ce livret avec vous. Les principaux symptômes que vous pourriez présenter sont illustrés au verso. Il peut arriver que ces effets secondaires mettent la vie en danger et causent la mort. Ces effets secondaires peuvent survenir à n'importe quel moment pendant le traitement, ou même une fois le traitement terminé. Si vous présentez n'importe lequel de ces symptômes, vous devez appeler ou voir votre médecin

immédiatement. Votre médecin pourrait vous prescrire d'autres médicaments pour éviter d'autres complications plus sévères et réduire vos symptômes, ou encore suspendre la prochaine dose de KEYTRUDA® ou mettre un terme au traitement avec KEYTRUDA®. Ne traitez aucun de ces symptômes vous-même sans avoir obtenu l'approbation de votre équipe soignante.

ALK = kinase du lymphome anaplasique; *EGFR* = récepteur du facteur de croissance épidermique; PD-L1 = ligand 1 de la mort cellulaire programmée

© Merck Sharp & Dohme LLC, utilisée sous licence.

© 2015, 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.



Pr **KEYTRUDA®**
(pembrolizumab)

Ce qu'il faut surveiller



YEUX

- Vue qui a changé
- Jaunissement de mes yeux
- Douleur aux yeux
- Sécheresse des yeux



BOUCHE ET TÊTE

- Bouche sèche
- Ulcères dans ma bouche et/ou sur les muqueuses de mon nez
- Inflammation de la muqueuse buccale
- Feu sauvage
- Congestion nasale
- Changement dans mon sens du goût
- Sensation d'évanouissement ou étourdissements
- Maux de tête qui ne disparaissent pas ou qui sont inhabituels
- Plus soif que d'habitude
- Enflure de mon visage
- Confusion
- Problèmes de mémoire
- Convulsions



GORGE ET POITRINE

- Toux nouvelle ou pire
- Ulcères dans ma gorge
- Voix plus grave
- Essoufflement
- Douleurs dans la poitrine
- Battements cardiaques rapides
- Battements cardiaques irréguliers
- Infection des voies respiratoires supérieures



PEAU ET CHEVEUX

- Sécheresse de la peau
- Jaunissement de ma peau
- Décoloration de ma peau à certains endroits (vitiligo)
- Éruptions cutanées ou démangeaisons de la peau
- Vésicules et/ou lésions douloureuses sur la peau
- Peau qui pèle
- Ulcères dans la région génitale
- Tendance plus élevée qu'à la normale aux saignements et aux ecchymoses
- Plus de transpiration que d'habitude
- Perte de cheveux
- Bosses sensibles sur la peau
- Démangeaisons
- Lésions cutanées rouges
- Plaques rouges avec squames argentées sur la peau accompagnées de démangeaisons (symptômes de psoriasis)
- Trouble cutané ressemblant à de l'acné



ESTOMAC ET INTESTIN

- Moins d'appétit ou plus d'appétit que d'habitude
- Nausées ou vomissements
- Constipation
- Diarrhée ou selles plus fréquentes que d'habitude
- Selles noires, goudronneuses et gluantes, ou accompagnées de sang ou de mucus
- Maux de ventre intenses ou sensibilité dans la région de l'estomac
- Douleur au côté droit de l'estomac
- Enflure du foie ou de la rate



URINE

- Changements à la quantité d'urine
- Besoin d'uriner plus souvent
- Changement de la couleur de mon urine
- Incontinence urinaire
- Difficulté à uriner



MUSCLES, ARTICULATIONS ET JAMBES

- Douleurs musculaires ou articulaires graves ou persistantes
- Troubles musculaires, qui peuvent entraîner une faiblesse et une fatigue rapide des muscles, ou encore une faiblesse ou des picotements dans les bras et les jambes
- Crampes ou spasmes musculaires
- Enflure des jambes ou des bras
- Maux de dos
- Douleurs, engourdissements ou picotements dans mes bras ou mes jambes ou dans mes pieds ou mes mains




SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

- Fatigue
- Déshydratation
- Fatigue ou faiblesse inhabituelle
- Symptômes semblables à ceux de la grippe
- Fièvre
- Frissons
- Perte ou gain de poids
- Plus froid que d'habitude
- Enflure des ganglions lymphatiques
- Faible nombre de globules rouges
- Engourdissement et faiblesse généralisés



SYMPTÔMES LIÉS À LA PERFUSSION

- Essoufflement
- Démangeaisons ou éruptions cutanées
- Étourdissements ou fièvre
- Respiration sifflante
- Bouffées vasomotrices
- Impression d'être sur le point de m'évanouir



Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire qui n'est pas énuméré ici, notez-le dans le journal fourni avec cette trousse et **informez-en votre équipe soignante immédiatement. N'attendez pas à votre prochain rendez-vous.**