

# EFFETS SECONDAIRES DE L'IMMUNOTHÉRAPIE CHEZ VOS PATIENTS TRAITÉS PAR KEYTRUDA<sup>®</sup>

PrKEYTRUDA<sup>®</sup> (pembrolizumab) est indiqué pour le traitement des adultes atteints d'un mélanome non résecable ou métastatique n'ayant jamais été traités avec l'ipilimumab. Les patients atteints d'un mélanome à mutation *BRAF V600* peuvent avoir reçu un traitement au moyen d'un inhibiteur du gène *BRAF*.

KEYTRUDA<sup>®</sup> est indiqué en monothérapie comme traitement de première intention chez les adultes atteints d'un CPNPC métastatique ou de stade III qui ne sont pas candidats à une résection chirurgicale ou à une chimioradiothérapie définitive, dont les tumeurs expriment le PD-L1 (PCT  $\geq$  1 %), tel que déterminé par un test validé, et qui ne présentent aucune aberration génomique tumorale du gène *EGFR* ou *ALK*. Une association positive entre le niveau d'expression du PD-L1 et l'ampleur de l'effet du traitement a été observée.

# CE QU'IL FAUT SURVEILLER?

## Effets secondaires de l'immunothérapie – KEYTRUDA®

Effets secondaires rapportés dans les études cliniques lorsque KEYTRUDA® est administré seul.



### YEUX

- Troubles de la vue
- Jaunissement du blanc des yeux
- Douleur aux yeux
- Sécheresse des yeux



### BOUCHE ET TÊTE

- Sécheresse buccale
- Ulcères dans la bouche et(ou) sur les muqueuses du nez
- Inflammation de la muqueuse buccale
- Feux sauvages
- Congestion nasale
- Altération du goût
- Étourdissements ou évanouissement
- Maux de tête qui ne disparaissent pas ou maux de tête inhabituels
- Plus grande soif que d'habitude
- Enflure du visage
- Confusion et(ou) troubles de mémoire
- Convulsions




### GORGE ET POITRINE

- Toux nouvelle ou pire
- Ulcères dans la gorge
- Voix qui devient plus grave
- Essoufflement
- Douleur thoracique
- Battements cardiaques rapides
- Battements de cœur irréguliers
- Infection des voies respiratoires supérieures



### PEAU ET CHEVEUX

- Sécheresse de la peau
- Jaunissement de la peau
- Décoloration de la peau par plaques (vitiligo)
- Éruptions ou démangeaisons de la peau
- Vésicules et(ou) des lésions douloureuses sur la peau
- Peau qui pèle
- Ulcères dans la région génitale
- Tendance plus élevée que la normale aux saignements et aux ecchymoses
- Plus de transpiration que d'habitude
- Perte de cheveux
- Bosses sensibles sur la peau
- Démangeaisons
- Lésions cutanées rouges
- Plaques rouges avec squames argentées sur la peau accompagnées de démangeaisons (symptômes de psoriasis)
- Problèmes de peau ressemblant à l'acné



### ESTOMAC ET INTESTIN

- Moins d'appétit ou plus d'appétit que d'habitude
- Nausées et(ou) vomissements
- Constipation
- Diarrhée
- Selles plus fréquentes que d'habitude
- Selles noires, goudronneuses et gluantes
- Selles avec du sang ou du mucus
- Maux de ventre intenses ou sensibilité dans la région de l'estomac
- Douleur au côté droit de l'estomac
- Enflure du foie ou de la rate



### URINE

- Changement de la quantité d'urine
- Changement de la couleur des urines
- Besoin d'uriner plus souvent
- Incontinence urinaire
- Difficulté à uriner



### MUSCLES, ARTICULATIONS ET JAMBES

- Douleurs musculaires graves ou persistantes
- Douleurs articulaires graves ou persistantes
- Troubles musculaires, qui peuvent entraîner une faiblesse et une fatigue rapide des muscles, ou encore une faiblesse ou des picotements dans les bras et les jambes
- Crampes ou spasmes musculaires
- Enflure des jambes ou des bras
- Maux de dos
- Douleurs, engourdissements ou picotements dans les bras, les jambes, les pieds ou les mains



### GÉNÉRALITÉS

- Fatigue
- Déshydratation
- Fatigue ou faiblesse inhabituelle
- Symptômes pseudogrippaux
- Fièvre
- Frissons
- Gain de poids
- Perte de poids
- Sensation d'avoir plus froid que d'habitude
- Enflure des ganglions lymphatiques
- Nombre de globules rouges anormalement bas
- Engourdissement et faiblesse généralisés



### SYMPTÔMES LIÉS À LA PERFUSION

- Essoufflement
- Démangeaisons ou éruptions cutanées
- Étourdissements ou fièvre
- Respiration sifflante
- Bouffées vasomotrices
- Impression d'être sur le point de s'évanouir

*Il est important de signaler immédiatement **tous les effets secondaires** au médecin traitant, avant de prendre en charge les effets indésirables.*

Consultez la monographie du produit à l'adresse [www.merck.ca/static/pdf/KEYTRUDA-PM\\_F.pdf](http://www.merck.ca/static/pdf/KEYTRUDA-PM_F.pdf) pour obtenir les renseignements importants suivants :

- les mises en garde et précautions pertinentes concernant les effets indésirables à médiation immunitaire, les réactions sévères liées à la perfusion, la conduite de véhicules et l'utilisation de machines, le risque tératogène, les femmes enceintes et qui allaitent, les enfants, les patients atteints d'insuffisance hépatique modérée ou grave et les patients atteints d'insuffisance rénale grave. Les fonctions hépatique et thyroïdienne ainsi que les électrolytes doivent faire l'objet d'une surveillance pendant le traitement;
- les conditions d'utilisation clinique, effets indésirables, interactions médicamenteuses et renseignements sur la posologie.

Il est également possible d'obtenir cette monographie en appelant au 1-800-567-2594, ou en envoyant un courriel à [medinfocanada@merck.com](mailto:medinfocanada@merck.com). Pour toute question au sujet de KEYTRUDA®, veuillez communiquer avec le Centre d'information médicale au 1-800-567-2594.

Référence : Monographie de KEYTRUDA®, Merck Canada Inc. 21 mars 2023.



© Merck Sharp & Dohme LLC, utilisée sous licence.  
© 2018, 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.



Pr **KEYTRUDA**  
(pembrolizumab)

CA-KEY01214